

## Fístula Aorto-cava em doente com rotura de aneurisma da aorta abdominal

*Aorta-cava fistula in a patient with ruptured aortic aneurysm*

\* SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR 2  
(HOSPITAL PULIDO VALENTE) DO  
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE  
(DIRECTOR: DR. J. PEREIRA ALBINO)  
\*\* SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR 1  
(HOSPITAL DE SANTA MARIA) DO  
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE  
(DIRECTOR: PROF. DOUTOR  
A. DINIS DA GAMA)

*Pedro Amorim\**, *Luís Mendes Pedro\*\**, *Luís Silvestre\*\**,  
*Jose L. Gimenez\*\**, *Ruy Fernandes e Fernandes\*\**, *José Tiago\*\**

Doente de 83 anos, com antecedentes pessoais conhecidos de colite ulcerosa, hérnia inguinal bilateral, síndrome depressivo e com diagnóstico de aneurisma da aorta abdominal desde há 7 anos (tendo recusado cirurgia electiva). Foi admitido no serviço de urgência do Hospital Santa Maria com dor lombar esquerda com três dias de evolução acompanhada de astenia, adinamia, prostração e cansaço para pequenos esforços. À observação clínica destaca-se palidez da pele e mucosas, caquexia, exuberante massa abdominal pulsátil localizada ao epigastro e região peri-umbilical com frémito e sopro contínuo sisto-diafástico. Sem edemas dos membros inferiores ou sinais de insuficiência arterial periférica. Hipotenso (90/60 mmHg), hemoglobina de

7 g/dL e ligeira insuficiência renal aguda.

A TC abdomino-pélvica confirmou a existência de aneurisma da aorta infra-renal com 10 cm de maior diâmetro, Hematoma Para-dórfico direito e marcada dilatação da veia cava inferior (VCI) com presença de contraste intra-luminal em fase arterial | FIGURAS |.

Na intervenção cirúrgica observou-se a presença de hematoma retroperitoeneal e após a abertura do saco aneurismático confirmou-se a presença de comunicação com a VCI. A cirurgia consistiu na ressecção parcial do aneurisma, encerramento endoaneurismático da fístula aorto-cava e interposição de enxerto aorto-bi-iliaco (Dracron 16/8).

O doente viria a falecer ao 39º dia de pós operatório com pneumonia nosocomial.

