

**Instântaneo Endoscópico / Endoscopic Spot**

**PROLAPSO RECTAL VOLUMOSO APÓS O TOQUE RECTAL**

R. PINHO, L. ALBERTO, S. FERNANDES, S. LEITE, J. PINTO, M. AFONSO, A. P. SILVA, J. FRAGA

*GE - J Port Gastreterol 2007, 14: 243*

Doente de 53 anos, sexo feminino, com história de hábitos etílicos (40-50 g/dia, desde os 30 anos). Enviada para realização de colonoscopia por “prolapso hemorroidário” após preparação cólica com 3 litros de solução de macrogol 3350 (Endofalk®), que decorreu sem incidentes.

Antes da realização do exame são evidentes alguns sinais compatíveis com doença hepática crónica descompensada (ascite de médio volume, edemas dos membros inferiores e icterícia das escleróticas). A inspecção da região anal não revelou alterações e não se identificaram lesões durante o toque rectal. Imediatamente após o toque rectal surge prolapso rectal volumoso (Figura 1) que se reduziu de imediato. A colonoscopia não mostrou lesões, tendo a doente sido referenciada para correcção cirúrgica.



**Figura 1 - Prolapso rectal volumoso após o toque rectal, fotografado com o colonoscópio.**

*Correspondência:*

Rolando Taveira Pinho  
 Serviço de Gastreterologia e Hepatologia  
 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia  
 Rua Conceição Fernandes  
 4434-502 Vila Nova de Gaia  
 Tel.: +351227865100  
 Fax: +351227830209  
 e-mail: rolandopinho@portugalmail.pt



*Figura 1 - Mucosa colica com aspecto difusamente nodular, revestida por mucosa normal, sugestiva de proctometria colica.*